
Epidemiologisches Bulletin

Wöchentlicher Informationsdienst für Ärzte

Bericht der Arbeitsgruppe Infektionsepidemiologie des BGA

Notausgabe

Inhalt	Seite
Redaktionelle Bemerkungen	1
Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Jahr 1994 (Tabelle)	2
Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Jahr 1993	3

Redaktionelle Bemerkungen

In Ergänzung des "Epidemiologischen Bulletins" Bd. 1, Heft 0, S. 5 (Situation in den ersten drei Quartalen 1993) erhalten Sie mit diesem Bulletin 4 Tabellen (ab S. 6) mit den vorläufigen Jahresenddaten 1993 für die meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Deutschland.

Die ersten beiden Tabellen enthalten die Daten für die häufigsten meldepflichtigen Infektionskrankheiten einschließlich der länderspezifischen Inzidenzraten.

Die beiden folgenden Tabellen zeigen die Meldedaten für die seltenen meldepflichtigen Krankheiten.

Verwertbare Daten für die Tuberkulose und die Geschlechtskrankheiten liegen aus den meisten Bundesländern nicht vor.

Da es sich bei den in den Tabellen ausgewiesenen Jahresdaten für 1993 um vorläufige Werte handelt, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese mit Ihren Landesdaten vergleichen würden und uns bei größeren Abweichungen eine Mitteilung zukommen lassen könnten.

Als besonders wichtig erachten wir das bei den sehr seltenen bzw. in Deutschland nicht endemischen Erkrankungen, da eine Korrektur durch die Jahresenddaten des Statistischen Bundesamtes vorläufig nicht möglich ist.

Bemerkungen zur Tabelle auf Seite 2

Die Berichte über meldepflichtige Infektionskrankheiten tragen dem Bedürfnis nach aktueller Information Rechnung. Bei dem gegenwärtig unterschiedlichen Stand des Berichtswesens in den einzelnen Bundesländern sind jedoch fehlende (z.B. Tuberkulose) bzw. differierende Daten (z.B. Abweichungen der kumulierten Daten des Vorjahres von den veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes) nicht vermeidbar.

Ein Sternchen in den Spalten für die laufende Woche zeigt an, daß für das jeweilige Land bzw. für den Regierungsbezirk noch keine aktuelle Wochenmeldung eingegangen ist.

Dies führt zu einer unvollständigen und mit dem Vorjahr nur bedingt vergleichbaren Kumulativzahl sowie zu einer Beeinträchtigung der Daten auf der(n) übergeordneten Berichtsebene(n).

Von allen Ländern vollständig und rechtzeitig übermittelte Berichte stellen die Voraussetzung für eine Verbesserung des aktuellen Informationssystems dar.

Berichte über meldepflichtige Infektionskrankheiten 6. Woche 1994

Land	Tuberkulose		Enteritis infectiosa		Virushepatitis		Virushepatitis		Meningokokken Mening.		Meningitis/Enzephalitis		virale Mening./Enzeph.														
	aktue TB	Salmonellose	übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	übrige Formen	Meningokokken Mening.	bakt. Mening., übrige	virale Mening./Enzeph.																		
Regierungsbezirk	6W. 1.-6W. 1984	1.-6W. 1984	6W. 1.-6W. 1984	1.-6W. 1984	6W. 1.-6W. 1984	1.-6W. 1984	6W. 1.-6W. 1984	1.-6W. 1984	6W. 1.-6W. 1984	1.-6W. 1984	6W. 1.-6W. 1984	1.-6W. 1984	6W. 1.-6W. 1984	1.-6W. 1984													
Baden-Württemberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Stuttgart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Freiburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Karlsruhe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Tübingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Bayern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Oberbayern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Niederbayern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Oberpfalz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Oberfranken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Mittelfranken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Unterfranken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Schwaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Berlin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Brandenburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Bremen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Hamburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Hessen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Darmstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Gießen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Kassel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Mecklenbg.-Vorpommern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Niedersachsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Braunschweig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Hannover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Lüneburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Weser-Ems	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Düsseldorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Köln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Münster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Detmold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Arnsberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Rheinland-Pfalz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Koblenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Trier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Rheinhesen-Pfalz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Saarland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Sachsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Chemnitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Dresden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Leipzig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Sachsen-Anhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Thüringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Gesamt	88	586	520	968	7276	8486	1196	6666	7219	71	568	820	75	681	726	53	327	306	17	108	80	11	96	108	5	36	72

Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Jahr 1993

Für die Salmonellose, deren Zahl 1993 deutlich niedriger lag als 1992, zeigt die folgende Tabelle für die neuen Bundesländer (NBL) und Berlin die Verteilung der Infektionen (Erkrankungsfälle plus Ausscheider) auf die wichtigsten Serovare sowie den Zu- bzw. Rückgang der einzelnen Serovare im Vergleich zu 1992.

Salmonellen-Serovare in den NBL und Berlin

Serovar	1992		1993		+/- gegenüber 1992
	Anzahl	%-Anteil	Anzahl	%-Anteil	
Enteritidis	47549	74.41	27821	65.82	-41.49
Typhimurium	9613	15.04	8525	20.17	-11.32
Virchow	406	.64	465	1.10	14.53
Infantis	645	1.01	398	.94	-38.29
Agona	239	.37	239	.57	.00
Panama	214	.33	228	.54	6.54
Saintpaul	90	.14	222	.53	146.67
Hadar	217	.34	176	.42	-18.89
Derby	147	.23	132	.31	-10.20
Bovismorbificans	135	.21	115	.27	-14.81
Livingstone	152	.24	113	.27	-25.66
Goldcoast	55	.09	111	.26	101.82
Manhattan	188	.29	107	.25	-43.09
Brandenburg	422	.66	106	.25	-74.88
Newport	37	.06	60	.14	62.16
sonstige	982	1.54	891	2.11	-9.27
untypisiert	2814	4.40	2559	6.05	-9.06
Summe	63905	100.00	42268	100.00	-33.86

Neben dem bereits mehrfach erwähnten Rückgang der Infektionen durch *S. enteritidis* (-41,5%) und *S. typhimurium* (-11%) sind auch die Rückgänge bei den Serovaren *Infantis* (-38%), *Hadar* (-19%), *Livingstone* (-26%), *Manhattan* (-43%) und *Brandenburg* (-75%) erheblich.

Deutliche Anstiege ergaben sich entgegen dem allgemeinen Rückgang der gemeldeten Infektionen bei den Serovaren *Virchow* (14,5%), *Panama* (6,5%), *Saintpaul* (147%) und *Goldcoast* (102%), wobei *S. saintpaul* trotz des Anstiegs das hohe Niveau der 80er Jahre noch nicht wieder erreicht hat. Auch *S. panama* hat in einzelnen Jahren (z.B. 1983 und 1987) bereits wesentlich mehr Infektionen verursacht.

Die regionale Verteilung zeigt außer für Hamburg und Thüringen für alle anderen Bundesländer einen deutlichen Rückgang der 1993 gemeldeten Erkrankungen.

Bei den übrigen Formen der *Enteritis infectiosa* war 1993 dagegen in der Mehrzahl der Bundesländer ein Anstieg erkennbar. Die gemeldeten Erkrankungsdaten liegen in den NBL allerdings (wahrscheinlich erfassungsbedingt) weiterhin auf etwas höherem Niveau. Den Anteil der häufigsten Erreger an dieser Meldekategorie zeigt für die NBL und Berlin die Abbildung 1 (s. S. 5). Entsprechende Daten für die Altbundesländer sind leider nicht verfügbar.

Bei 1993 erstmals wieder zu beobachtendem Rückgang der gemeldeten *Hepatitis A*-Erkrankungen in Deutschland insgesamt, zeigen die Inzidenzraten in den verschiedenen Bundesländern weiterhin ein sehr unterschiedliches Niveau (Abbildung 2). Eine Tendenz zum Rückgang der Werte - besonders in den Stadtstaaten - ist unverkennbar. Besonders deutlich war dieser Rückgang in Bremen; auch bei den anderen Formen der *Hepatitis*.

Auch bei der **Hepatitis B** ergab sich im Jahr 1993 eine Trendwende. Wie bei der Hepatitis A, war in der Mehrheit der Bundesländer ein Rückgang der Morbidität zu beobachten, bei weiterhin erkennbarem höheren Morbiditätsniveau in den Stadtstaaten (Abbildung 3).

Bei den **übrigen Formen der Hepatitis** ist die gemeldete Morbidität, trotz deutlicher Rückgänge in den Stadtstaaten Hamburg (-25%) und Bremen (-29%);, Abbildung 4) insgesamt weiter angestiegen.

Ob dies auf eine echte Zunahme der Hepatitis C (z.B. unter Drogensüchtigen) zurückzuführen ist, oder ob nur eine verbesserte Erfassung von Infektionen (d.h. auch chronischen) durch eine intensivere Diagnostik den Anstieg verursacht hat, kann aus den Meldedaten nicht zwingend geschlußfolgert werden. Es spricht jedoch einiges für die zweite Annahme.

Bei der **Ornithose** zeichnete sich in den letzten beiden Jahren eine Zunahme der gemeldeten Fälle ab. Während davon 1992 hauptsächlich die neuen Bundesländer betroffen waren, zeigten 1993 auch viele Altbundesländer deutliche Anstiege. Von einer Umkehr des seit 10 Jahren leicht fallenden Trends kann jedoch noch nicht gesprochen werden.

Mit einer Inzidenzrate von 0,8 E pro 100 000 EW liegt Sachsen-Anhalt 1993 weit über dem Niveau der anderen Bundesländer.


Bei der **Leptospirose** bewegt sich die Morbidität trotz eines Anstiegs in den beiden vergangenen Jahren weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. In den neuen Bundesländern ist die gemeldete Inzidenz, verglichen mit den Jahren vor der Vereinigung, sogar besonders niedrig. Möglicherweise ist das aber nur die Folge einer verminderten Diagnostik und/oder Meldung.

Die Zahl der in Deutschland gemeldeten **Malaria**-Erkrankungen ist auch 1993 weiter zurückgegangen. Anstiege ergaben sich nur in einigen der NBL - bei dort allerdings weiterhin sehr niedrigem Morbiditätsniveau - sowie in Hamburg (41%), Bremen (78%) und Niedersachsen (12%).


Die 1993 gegenüber dem Vorjahr niedrigere Zahl gemeldeter Erkrankungen an **Q-Fieber** ist bedingt durch eine im Jahr 1992 überhöhte Morbidität auf Grund von Erkrankungshäufungen in Baden-Württemberg (51 E) und in Berlin (51 E).

1993 ergab sich dagegen in Nordrhein-Westfalen - durch eine Häufung im 1. Halbjahr - und in Hessen - durch eine Häufung im 2. Halbjahr - eine Verdopplung der gemeldeten Erkrankungen gegenüber dem Vorjahr.


Enteritis infectiosa in den neuen Bundesländern




Hepatitis A in Deutschland Inzidenzraten in den Ländern



Hepatitis B in Deutschland Inzidenzraten in den Ländern



Hepatitis - übrige Formen Inzidenzraten in den Ländern



Meldepflichtige Infektionskrankheiten in Deutschland

Berichtszeitraum: 1993 gesamt (vorläufige Daten)

Land	Enteritis infectiosa		Typhus	Para-typhus	Shigellen ruhr	Virushepatitis		Meningitis/Enzephalitis		Malaria			
	Salmonellose	übrige				A	B sonst.	Mening. so.bakt.	Virus-übrige				
Baden-Württemb.	18971	5524	36	23	351	622	798	679	107	112	86	55	134
Bayern	24859	6165	40	18	481	419	553	249	89	170	80	62	129
Berlin	4364	983	20	6	163	671	272	104	23	37	24	107	69
Brandenburg	6098	2452	2	2	40	95	93	19	25	65	20	45	8
Bremen	660	379	6	0	15	29	66	48	8	3	0	5	9
Hamburg	3111	1559	5	0	58	331	423	192	21	30	11	14	74
Hessen	9037	1652	11	11	81	371	546	128	64	43	23	29	40
Mecklenb.-Vorp.	5741	3062	2	3	36	110	79	5	35	35	107	0	4
Niedersachsen	11128	5172	13	12	57	650	786	315	75	83	26	69	62
Nordrh.-Westf.	22967	14416	35	11	159	1735	1150	515	183	187	80	123	64
Rheinl.-Pfalz	7526	3068	6	0	121	200	230	115	31	56	12	25	23
Saarland	1730	790	1	4	7	109	68	22	16	10	0	5	12
Sachsen	9996	5263	8	0	180	129	99	34	52	57	121	0	24
Sachsen-Anhalt	5738	3827	0	0	98	174	72	13	33	47	47	0	14
Schlesw.-Holst.	3273	1541	5	3	22	136	203	49	25	26	12	17	22
Thüringen	5334	2546	3	1	52	60	51	6	23	24	44	2	9
Summe	140533	58399	193	94	1921	5841	5489	2493	810	985	693	558	697
Inzidenzrate	173.54	72.12	.24	.12	2.37	7.21	6.78	3.08	1.00	1.22	.86	.69	.86
Inzid. Vorjahr	243.09	63.69	.27	.15	2.91	8.7	7.45	2.72	1.02	1.28	2.07	.89	.96
+/- in %	-28.61	13.23	-11.73	-22.61	-18.48	-17.09	-9.02	13.18	-1.94	-4.97	-58.66	-22.58	-10.34
alte Länder *)	107626	41249	178	88	1515	5273	5095	2416	642	757	354	511	638
Inzidenzrate	161.64	61.95	.27	.13	2.28	7.92	7.65	3.63	.96	1.14	.53	.77	.96
Inzid. Vorjahr	221.79	57.83	.31	.17	2.64	9.68	8.44	3.17	.93	1.2	.78	1.02	1.12
+/- in %	-27.12	7.13	-13.76	-22.26	-13.81	-18.19	-9.34	14.47	3.68	-5.26	-31.84	-24.76	-14.45
neue Länder *	32907	17150	15	6	406	568	394	77	168	228	339	47	59
Inzidenzrate	228.57	119.12	.10	.04	2.82	3.95	2.74	.53	1.17	1.58	2.35	.33	.41
Inzid. Vorjahr *	340.1	90.39	.08	.03	4.13	4.22	2.94	.7	1.4	1.67	7.93	.3	.23
+/- in %	-32.79	31.79	30.23	38.92	-31.72	-6.51	-6.92	-23.60	-16.65	-5.17	-70.31	8.82	78.18

*) inkl. Berlin
* exkl. Berlin

Meldepflichtige Infektionskrankheiten in Deutschland

Berichtszeitraum: 1993 gesamt (vorläufige Daten)

Neuerkrankungsrate pro 100 000 EW

Land	Enteritis infectiosa		Typhus	Para-typhus	Shigellenruhr	Virushepatitis		Meningitis/Enzephalitis		Malaria			
	Salmonellose	übrige				A	B	sonst.	so.bakt.		Virus-übrige		
Baden-Württemb.	186.93	54.43	.35	.23	3.46	6.13	7.86	6.69	1.05	1.10	.85	.54	1.32
Bayern	211.20	52.38	.34	.15	4.09	3.56	4.70	2.12	.76	1.44	.68	.53	1.10
Berlin	125.92	28.36	.58	.17	4.70	19.36	7.85	3.00	.66	1.07	.69	3.09	1.99
Brandenburg	239.28	96.21	.08	.08	1.57	3.73	3.65	.75	.98	2.55	.78	1.77	.31
Bremen	96.23	55.26	.87	-	2.19	4.23	9.62	7.00	1.17	.44	-	.73	1.31
Hamburg	184.22	92.31	.30	-	3.43	19.60	25.05	11.37	1.24	1.78	.65	.83	4.38
Hessen	152.58	27.89	.19	.19	1.37	6.26	9.22	2.16	1.08	.73	.39	.49	.68
Mecklenb.-Vorp.	307.86	164.20	.11	.16	1.93	5.90	4.24	.27	1.88	1.88	5.74	-	.21
Niedersachsen	146.86	68.25	.17	.16	.75	8.58	10.37	4.16	.99	1.10	.34	.91	.82
Nordrh.-Westf.	129.91	81.54	.20	.06	.90	9.81	6.50	2.91	1.04	1.06	.45	.70	.36
Rheinl.-Pfalz	193.92	79.05	.15	-	3.12	5.15	5.93	2.96	.80	1.44	.31	.64	.59
Saarland	159.59	72.88	.09	.37	.65	10.06	6.27	2.03	1.48	.92	-	.46	1.11
Sachsen	215.38	113.40	.17	-	3.88	2.78	2.13	.73	1.12	1.23	2.61	-	.52
Sachsen-Anhalt	205.15	136.83	-	-	3.50	6.22	2.57	.46	1.18	1.68	1.68	-	.50
Schlesw.-Holst.	122.15	57.51	.19	.11	.82	5.08	7.58	1.83	.93	.97	.45	.63	.82
Thüringen	209.52	100.01	.12	.04	2.04	2.36	2.00	.24	.90	.94	1.73	.08	.35
Deutschland	173.54	72.12	.24	.12	2.37	7.21	6.78	3.08	1.00	1.22	.86	.69	.86

(vorläufige Daten)
Stand: 18.2.94

Meldepflichtige Infektionskrankheiten in Deutschland
1993 gesamt

Tabelle 2

Land	Botulis-Brucellose		Orni- those	Gasbrand Tetanus		Leptospirose		Q-Fieber		konnatale Infektionen			Toxopl.	Röteln
	mus	Lose		M.Weil	sonst.	Cytomeg.	Lister.	Lues						
Baden-Württemb.	4	3	10	2	11	2	2	4	14	1	6	4	1	
Bayern	2		27	6	13	6	1	2	4	2	9		2	
Berlin		1	9	1	2	1	1		2	1	1			
Brandenburg		1	9	4	4								1	
Bremen		1	1	1	1					1				
Hamburg		2	4	1	1						3			
Hessen		3	17	10	1	1	1	1	16	2	2		2	
Mecklenb.-Vorp.	1	2	5	3	1	1	1		1					
Niedersachsen		2	22	2	12	2	2	1	1	2	2	3	4	
Nordrh.-Westf.	2	4	26	38	2	2	4	3	38	2	5	1	6	
Rheinl.-Pfalz	2	1	12	10	2	2	2		1	1	1		1	
Saarland			4						1					1
Sachsen			18	1	10	1	5			2		1	1	
Sachsen-Anhalt	6		22	1	11	1	1			1			1	
Schlesw.-Holst.		1	7	4	4		1							
Thüringen			8	2	5	2	5		2					
Summe	17	20	201	17	135	17	14	25	79	14	29	11	20	1
Inzidenzrate	.02	.02	.25	.02	.17	.02	.02	.03	.10	.02	.04	.01	.02	.00
Summe Vorjahr	4	23	159	14	136	14	17	13	166	13	42	10	19	7
+/- in %	325	-13	26	21	-1	21	-18	92	-52	8	-31	10	5	-86
alte Länder *)	10	17	139	13	102	13	13	14	76	11	29	10	17	0
Inzidenzrate	.02	.03	.21	.02	.15	.02	.02	.02	.11	.02	.04	.02	.03	.00
Summe Vorjahr	2	18	110	13	109	13	15	7	162	11	36	8	17	4
+/- in %	400	-6	26	0	-6	0	-13	100	-53	0	-19	25	0	-100
neue Länder *	7	3	62	4	33	4	1	11	3	3	0	1	3	1
Inzidenzrate	.05	.02	.43	.03	.23	.03	.01	.08	.02	.02	.00	.01	.02	.01
Summe Vorjahr	2	5	49	27	1	1	2	6	4	2	6	2	2	3
+/- in %	250	-40	27	22	300	300	-50	83	-25	50	-100	-50	50	-67

*) inkl. Berlin
* exkl. Berlin

Meldepflichtige Infektionskrankheiten in Deutschland
 1993 gesamt
 (vorläufige Daten)
 Stand: 18.2.1994
 Tabelle 3

Land	Cholera	Diph- terie	Fleck- fieber	Gelb- fieber	Milz- brand	Lepra	Pest	Polio- myelitis	Rotz	Rückfall- fieber	Toll- wut	Trachom	Trichi- nose	Tular- ämie
Baden-Württemb.		1										1		1
Bayern		1												2
Berlin	1												2	
Brandenburg														1
Bremen														
Hamburg		3							1					
Hessen														
Mecklenb.-Vorp.														
Niedersachsen		3												
Mordrh.-Westf.		1											1	
Rheinl.-Pfalz		1			1						1			
Saarland														
Sachsen														
Sachsen-Anhalt														
Schlesw.-Holst.														
Thüringen														1
Summe	1	10	1	0	1	5	0	0	1	1	1	7	3	2
Inzidenzrate	.00	.01	.00	.00	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.00	.00
Summe Vorjahr	2	1	1	0	2	1	0	2	0	1	1	1	3	2
alte Länder *)	1	10	1	0	1	5	0	0	1	1	1	6	3	2
Inzidenzrate	.00	.02	.00	.00	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.00	.00
Summe Vorjahr	2	1	1	0	2	1	0	2	0	1	1	0	3	2
neue Länder *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Inzidenzrate	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.00	.00
Summe Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

*) inkl. Berlin
 * exkl. Berlin