




# Kontaktpersonennachverfolgung

## bei SARS-CoV-2-Infektionen



### Ermittlung von Kontaktpersonen bei bestätigtem COVID-19-Fall

- ▶ **Symptomatischer Fall:** Ab 2 Tage vor Auftreten erster Symptome bis mindestens 14 Tage nach Symptombeginn
- ▶ **Asymptomatischer Fall:** Ab 2 Tage vor Test bis mindestens 14 Tage nach Test

### Definition enger Kontaktpersonen (mit erhöhtem Infektionsrisiko)

- ▶ Enger Kontakt (<1,5 m Abstand) > 10 min **ohne** adäquaten Schutz
- ▶ Gespräch (<1,5 m Abstand) **ohne** adäquaten Schutz unabhängig von Dauer oder direkter Kontakt mit respiratorischem Sekret
- ▶ Aufenthalt im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole für > 10 min



**Hinweis:** Für adäquaten Schutz tragen Fall- und Kontaktperson durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske. Bei geschultem medizinischem Personal reicht es, wenn dieses eine FFP2-Maske korrekt trägt.

### Gesundheitsamt

- ▶ Ermittlung, namentliche Registrierung
- ▶ Rückwärts- und Vorwärtsermittlung
- ▶ Priorisierung von Ereignissen mit hohen Übertragungsraten, Beteiligung von Risikogruppen
- ▶ Information über Krankheit und Übertragung



### Enge Kontaktperson

- ▶ **Kontaktreduktion**
  - Häusliche Quarantäne für 14 Tage; auch Personen mit SARS-CoV-2-Infektion vor > 6 Monaten
  - Keine Quarantäne für vollständig Geimpfte sowie Genesene mit einmaliger Impfstoffdosis erforderlich
  - Erneute Quarantäne immer bei Verdacht auf besorgniserregende Variante (VOC), außer B.1.1.7
  - Angebot einer Quarantäne außerhalb des Haushalts nach Maßgaben des Gesundheitsamts
- ▶ **Testung**
  - Zu Beginn der Quarantäne möglichst mittels PCR-Test; alternativ auch Antigen-Schnelltest
  - Durchführung von Antigentests 2 x wöchentlich sowie an Tag 14 vor Entlassung aus der Quarantäne
- ▶ **Gesundheitsüberwachung**
  - Regelmäßiger Kontakt mit Gesundheitsamt
  - Täglich Messung der Körpertemperatur und Tagebuch zu Symptomen bis 7 Tage nach Entlassung aus der Quarantäne



### Maßnahmen bei Auftreten von Symptomen

- ▶ Sofortiger Kontakt zu Gesundheitsamt und Testung mittels PCR-Test
- ▶ Isolation gemäß Vorgaben des Gesundheitsamts
- ▶ Kontaktpersonen ab 2 Tage vor Symptombeginn notieren

