

Bundesgesundheitsbl 2019 · 62:534
<https://doi.org/10.1007/s00103-019-02933-x>
Online publiziert: 26. März 2019
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil
von Springer Nature 2019



**Thorsten Rieck^{1,2} · Dorothea Matysiak-Klose¹ · Wiebke Hellenbrand¹ ·
Judith Koch¹ · Marcel Feig¹ · Anette Siedler¹ · Ole Wichmann¹**

¹ Abteilung für Infektionsepidemiologie, Robert Koch-Institut, Berlin, Deutschland

² Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland

Erratum zu: Umsetzung der Masern- und Pertussisimpfempfehlungen für Erwachsene

Erratum zu:

Bundesgesundheitsbl 2019

<https://doi.org/10.1007/s00103-019-02902-4>

In der Originalfassung des Artikels wurde leider ein inkorrekt er Wert für die 10-Jahres-Impfquote für Diphtherie genannt. Korrekt lautet der entsprechende Satz wie folgt:

Während die 10-Jahres-Impfquote für Diphtherie (51,1 %) in der Größenordnung von anderen Erhebungen lag, lag die 10-Jahres-Impfquote für Tetanus rund 20 Prozentpunkte darunter [15, 23].

Der Originalartikel wurde korrigiert.

Korrespondenzadresse

Dipl.-Biol. Thorsten Rieck, MScIH
Abteilung für Infektionsepidemiologie,
Robert Koch-Institut
Berlin, Deutschland
RieckT@rki.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00103-019-02902-4>
zu finden.