



## Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox

Stand: 03.07.2026

**Ständiger Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren  
für Krankheiten durch hochpathogene Erreger (STAKOB)  
beim Robert Koch-Institut**

**Für den STAKOB erarbeitet von:**

Torsten Feldt, Wolfgang Guggemos, Nils Kellner, Robin Kobbe, Christoph Lübbert, Frieder Pfäfflin, Katja Rothfuss, Michael Seilmaier, Stefan Schmiedel, Miriam Stegemann, Alexander Uhrig, Timo Wolf

**Unter Mitwirkung von:**

Deutsche Gesellschaft für Infektiologie e.V. (DGI)

Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit e. V. (DTG)

Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e.V. (DGPI)

Paul-Ehrlich-Institut (PEI)

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Pocken Konsiliarlabor am RKI – ZBS 1

**Kontakt:**

STAKOB Geschäftsstelle am Robert Koch-Institut

E-Mail: [stakob@rki.de](mailto:stakob@rki.de)

Website: [www.rki.de/stakob](http://www.rki.de/stakob)

**Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,**

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob](http://www.rki.de/stakob), DOI 10.25646/10113.15

## Zusammenfassung der letzten Änderungen

Änderung vom 03.07.2026: Aktualisierung der Informationen und Hinweise zum Einsatz von Tecovirimat

Änderung vom 28.01.2026: Aktualisierung der Informationen zu Epidemiologie und klinischer Versorgung (u.a. Empfehlung zu Isolierung), Ergänzung im Abschnitt zu Therapie (topische Therapie bei Keratitis), Aktualisierung der Quellen, redaktionelle Anpassungen.

Änderung vom 30.07.2025: Aktualisierung der Informationen zu Tecovirimat (Publikation der PALM 007- Studie, Erstergebnisse der STOMP-Studie), Aktualisierung der Informationen zu Impfempfehlungen, Aktualisierung der Quellen, redaktionelle Anpassungen

Änderung vom 05.02.2025: Anpassung der Informationen zu Postexpositionsprophylaxe, Ergänzung der Informationen zu Tecovirimat (Zwischenergebnisse der STOMP-Studie), redaktionelle Anpassungen

Änderung vom 14.11.2024: Ergänzung im Abschnitt zu Therapie (inhaltliche Ausarbeitung zur supportiven Therapie), Aktualisierung der Quellenangaben und redaktionelle Anpassungen

Änderung vom 06.09.2024: Aktualisierung zu epidemiologischer Situation und bisheriger Informationen zu Klade Ib, in Abschnitten zu klinischen Symptomen, Therapie und Impfung. Aktualisierung der Quellenangaben und redaktionelle Anpassungen

Änderung vom 28.03.2023: Redaktionelle Anpassung

Änderung vom 14.02.2023: Anpassung im Abschnitt „Patientenversorgung“ (Isolationsdauer)

Änderung vom 12.12.2022: Redaktionelle Anpassung der Bezeichnung der Erkrankung (Mpox/Affenpocken)

Änderung vom 01.12.2022: Aktualisierung der Informationen zum Impfstoff und zur Impfempfehlung

Änderung vom 18.11.2022: Redaktionelle Anpassung.

Änderung vom 29.07.2022: Aktualisierung der Informationen zum Impfstoff, Ergänzung der Informationen zu Impfempfehlungen

Änderung vom 22.07.2022: Aktualisierung der Informationen zu Therapie.

Änderung vom 12.07.2022: Aktualisierung der Informationen zu Prophylaxe. Ergänzung und Aktualisierung der Informationen über den klinischen Verlauf. Redaktionelle Überarbeitung.

**Hinweis**

Der STAKOB veröffentlicht als unabhängiges Gremium eigenverantwortlich Hinweise zu Therapie, Prophylaxe und weiteren klinischen Fragestellungen bei Erkrankungen durch hochpathogene Erreger. Die Therapiehinweise des STAKOB beruhen auf dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand, Informationen renommierter Gesundheitsinstitutionen und den Erfahrungswerten des STAKOB.

Die Anwendbarkeit der Therapiehinweise ist individuell zu prüfen.

## Allgemeine Hinweise

Mpox ist eine durch Monkeypoxvirus (MPXV) aus der Gattung Orthopoxvirus verursachte Viruserkrankung. Man unterscheidet zwei genetisch unterschiedliche Kladen, die in Zentralafrika endemische Klade I und die in Westafrika endemische Klade II. Reserviertiere in afrikanischen [Endemiegebieten](#) (u.a. Nigeria, Kamerun, Demokratische Republik [DR] Kongo, Republik Kongo) sind nicht Affen, sondern vermutlich Nagetiere. Die Infektion erfolgt über einen engen Umgang mit den infizierten Tieren und ihren Körperflüssigkeiten oder ihrem Fleisch bzw. mit kontaminiertem Material (Reynolds et al., 2006). Infektionen können auch als Tröpfcheninfektion durch Kontakt mit Sekreten infizierter Tiere übertragen werden. Durch engen Haut- oder Schleimhautkontakt zu einer mit MPXV-infizierten Person, insbesondere über die Mpox-Läsionen, andere offene Haut- oder Schleimhautwunden oder den Wundschorf, ist eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich. Sehr selten sind auch Übertragungen durch respiratorische Tröpfchen im Nahfeldbereich mit limitierten Infektionsketten beschrieben, z. B. durch enge Körpernähe im Rahmen eines sexuellen Kontaktes oder im Rahmen der Krankenversorgung, siehe auch [www.rki.de/mpox-ratgeber](http://www.rki.de/mpox-ratgeber) (Vaughan et al., 2020).

Seit Mai 2022 wurden MPXV-Infektionen in verschiedenen Ländern außerhalb Afrikas Fälle ohne Reiseanamnese in bekannte Endemiegebiete registriert, darunter auch in Deutschland. Diese Fälle betrafen bisher vor allem Männer, die Sex mit Männern (MSM) hatten. Die hierbei zirkulierenden Viren sind eng mit Viren der Klade II verwandt und werden als Klade IIb bezeichnet (Ulaeto et al., 2023). Nach einer großen Infektionswelle 2022 wurden seit 2023 in Deutschland nur vergleichsweise geringe Fallzahlen registriert (Stand Juli 2026).

Seit 2023 berichtet die WHO über einen Anstieg von Infektionen mit Mpox-Klade I in Afrika, insbesondere in der DR Kongo, aber auch in einigen zentral- und ostafrikanischen Ländern, siehe WHO: [Mpox: Multi-country external situation report no. 65, published 30 April 2026](#) . Diese Subklade wird als Klade Ib bezeichnet. Vereinzelt wurden seit 2025 Mpox-Fälle der Klade Ib nach Europa (u.a. auch nach Deutschland) importiert. Seit Oktober 2025 wurden in mehreren europäischen Ländern vereinzelt Infektionen mit Klade Ib ohne Reiseanamnese bekannt, die wahrscheinlich im Rahmen sexueller MSM-Kontakte zustande kamen ([WHO: Disease Outbreak News](#)).

Auch diese Variante überträgt sich durch engen körperlichen Kontakt, z.B. im familiären Kontext oder in Flüchtlingslagern in Ausbruchsgeländen unter schlechten hygienischen Bedingungen (Bugeme et al, 2025; Nzoyikorera et al., 2024). Betroffen durch die Infektion sind vor allem junge Erwachsene (sowohl MSM, aber auch heterosexuelle Männer und Frauen) und – in Endemiegebieten- Kinder (Adebisi et al., 2024; Bugeme et al, 2025; siehe auch: [WHO: 2022-24 Mpox \(Monkeypox\) Outbreak: Global Trends. Situation in Africa.](#)).

### **Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,**

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

Mittlerweile wurden in über 140 Ländern weltweit Mpox durch beide Klade berichtet mit Gesamtmortalität von 0,3% ([CDC, 2026](#)). Es wurden auch die ersten rekombinanten (Klade Ib und IIb) MPXV-Infektionen diagnostiziert ([WHO: Disease Outbreak News, 2026](#)).

Weitere Informationen finden sich auch auf der Seite des Robert Koch-Instituts (RKI) – [www.rki.de/mpox](http://www.rki.de/mpox) sowie [www.rki.de/mpox-ratgeber](http://www.rki.de/mpox-ratgeber).

Weite Teile der Weltbevölkerung haben aktuell keinen durch die früheren Pockenschutzimpfungen vermittelten Impfschutz, da die reguläre Impfpflicht gegen Pocken in den meisten Ländern vor über 40 Jahren beendet wurde. Der Pockenimpfstoff bietet geimpften Personen im Rahmen einer Kreuzimmunität auch einen relativen Schutz vor zoonotischen Pocken-Erkrankungen wie Mpox. Um das Mpox-Infektionsgeschehen eindämmen zu können und Erkrankungen zu verhindern, wird in Deutschland seit Juni 2022 Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko eine Impfung mit dem in der EU zur Impfung gegen Mpox zugelassenen Pocken-Impfstoff (Modified Vaccinia Ankara-Bavaria-Nordic (MVA-BN)-Impfstoff (Imvanex) empfohlen (s.u.).

## Klinischer Verlauf

Nach einer Inkubationszeit von 5 bis 21 Tagen (in Einzelfällen auch nur 2 bis 4 Tage) äußert sich die Infektion häufig durch Auftreten eines oder mehrerer der folgenden unspezifischen Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Myalgien, Cephalgien, Fatigue, Arthralgien, Rückenschmerzen oder Lymphadenopathie im Sinne einer Prodromalphase (Patel et al., 2022; Philpott et al., 2022; Thornhill et al., 2022). Diese Symptome können dem Auftreten der typischen Hautläsionen vorausgehen, sind jedoch nicht obligat und zum Teil nur flüchtig. Typisch für Mpox sind Hauteffloreszenzen (makulopapulöse bis vesikulopustulöse Läsionen, auch im Perianal-/Urogenitalbereich, Enantheme oral, ggf. rektal und genital), welche die Stadien Macula, Papula, Vesicula und Pustula durchlaufen und letztlich verkrusten und abfallen, [www.rki.de/mpox-bilder](http://www.rki.de/mpox-bilder) (Angelo et al., 2023; Prasad et al., 2023).

Differenzialdiagnostisch ist z.B. an Windpocken, Syphilis, (generalisierten) Zoster, Scharlach, Herpes simplex-Infektionen, Lymphogranuloma venereum und andere Pockenvirus-Infektionen (Tierpocken) zu denken.

Die genaue Beziehung zwischen MPXV-Kladen und der Manifestation von Symptomen sowie dem Schweregrad einer Mpox-Erkrankung ist Gegenstand laufender Untersuchungen. Hauteffloreszenzen treten am häufigsten im Bereich der Infektionspforte auf. Bei Klade IIb und Ib werden aufgrund des hauptsächlichlichen Übertragungsweges durch Sexualkontakte insbesondere in Anzahl begrenzte Läsionen im Urogenitalbereich beobachtet, aber auch an Extremitäten (inkl. Handinnenflächen und Fußsohlen), thorakal und im Gesichtsbereich (Brosius et al., 2025; Guagliardo et al., 2024; Tarin-Vicente et al., 2022). Auch eine Dissemination über die gesamte Hautoberfläche ist möglich, v.a. bei immunkompromittierten Personen,

### Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

und korreliert mit der Schwere des Krankheitsverlaufs (Cho et al., 2024; Liu et al., 2023; Masirika et al., 2024; Yon et al., 2023).

Neben den kutanen Effloreszenzen ist auch ein Enanthem oropharyngeal, anorektal oder urogenital beschrieben. Schleimhautläsionen führen meistens zu starken Schmerzen, ein anorektaler Befall nicht selten zu Proktitis und Diarrhoe.

Die Erkrankung kann nach 14 bis 21 Tagen selbstlimitierend verlaufen (Thornhill et al., 2022), deutlich längere Verläufe sind aber möglich. Die Krankheit verläuft i. d. R. mild bis moderat. Trotzdem kann es zu komplizierten Verläufen mit Bildung von schmerzhaften Ulzerationen und Nekrosen kommen, z. B. auch durch bakterielle Superinfektionen. Auch Enzephalitiden und andere Organkomplikationen wie z. B. Myokarditiden sind beschrieben worden (Badenoch et al., 2022; Halani et al., 2026; He et al., 2022). Als schwere Krankheitsfolgen können entstellende Narben und, bei Augenbeteiligung, bleibende Hornhautschäden bis hin zum Sehverlust entstehen (Rojas-Carabali et al., 2023; Zong et al., 2023).

Die mit einer MPXV-Infektion verbundene Morbidität und Mortalität war in der Vergangenheit für die zentralafrikanische Klade I höher als für die westafrikanische Klade II, (ca. 10,6 % vs. 3,6 %) (Americo et al., 2023; Bunge et al., 2022; Cho et al., 2024; Gessain et al., 2022;). Allerdings basieren diese Beobachtungen auf Fallserien aus verschiedenen Regionen Afrikas mit unterschiedlichen medizinischen Versorgungsstandards. Für Klade Ib zeigt sich in den endemischen Ländern Afrikas mittlerweile eine der Klade II ähnliche Krankheitschwere (siehe: [WHO: Global mpox trends](#)). Die weltweite Gesamtleitfähigkeit von Mpox, bezogen auf alle Länder und Kladen, beträgt 0,3 % (Stand Dezember 2025, siehe: [WHO Rapid Risk Assessment - Mpox, Global v.6](#)).

Vor allem bei sehr jungen und/oder immungeschwächten Patientinnen und Patienten sind gerade in den bisherigen Endemiegebieten schwere Verläufe (inkl. Dissemination und Organbeteiligung) beschrieben (Nitsche et al., 2019; Sanchez Clemente et al., 2024). Eine Infektion in der Schwangerschaft kann neben Gefährdung der Schwangeren auch zu einer Fehl- und Totgeburt führen (Bunge et al., 2022; D'Antonio et al., 2023; Nolen et al., 2016; Sanchez Clemente et al., 2024; Sharif et al., 2023).

Die bisher in den europäischen Ländern und darunter in Deutschland beobachteten Verläufe betrafen v.a. junge Erwachsene und verliefen mild. Die Letalität im Zusammenhang mit dem Ausbruch von 2022 mit der Klade IIb wurde auf weniger als 0,1 % geschätzt, wobei die meisten Todesfälle bei immungeschwächten Personen mit fortgeschrittener HIV-Infektion auftraten (DeWitt et al., 2022; Mitja et al., 2023).

## Fallerkennung

Als Orientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte steht ein Flussschema zur Verdachtsabklärung und Maßnahmen auf der Internetseite des RKI zur Verfügung unter [www.rki.de/mpox-flussschema](http://www.rki.de/mpox-flussschema).

### Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

## Hinweise zur Diagnostik

Empfohlene Materialien zur Diagnostik umfasst trockene Abstriche offener Hautläsionen, Krustenmaterial (Wundschorf), oder – bevorzugt – Vesikelflüssigkeit. Im Falle eines hochgradigen klinischen Verdachtes und fehlenden Effloreszenzen kann auch ein Rachenabstrich untersucht werden. Eine Testung asymptomatischer Personen ist hingegen obsolet.

Für die PCR-Diagnostik aus Läsionen sollte bei der Abstrichentnahme mittels trockener Tupfer eine ausreichende Menge Vesikelflüssigkeit aufgenommen werden. Bei Krusten sollte Krustenmaterial mit einer Pinzette in ein steriles Röhrchen überführt werden.

Für neu auftretende Virusvarianten wurde der Ausfall eines Klade I-spezifischen PCR Assays durch Deletion von Teilen der Zielsequenz beschrieben. Die Verwendung einer Kombination von Mpox generischen und Klade-spezifischen Tests ermöglicht die Erkennung von falsch-negativen Ergebnissen.

Eine serologische Blutuntersuchung auf Antikörper ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll, der direkte Virusnachweis aus Abstrichen oder Krusten mittels rt-PCR ist vorrangig durchzuführen. Weitere Hinweise zur Diagnostik finden sich auf der Seite des Konsiliarlabors für Pocken am RKI (RKI; ZBS1, Konsiliarlabor Pocken, [www.rki.de/kl-pocken](http://www.rki.de/kl-pocken)).

Weitere Speziallabore bieten ebenfalls eine molekulare Diagnostik zur Identifizierung von Mpox-Virusinfektionen und Typisierung des Erregers an, z.B.:

- Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr, Oberstarzt Prof. Dr. Roman Wölfel, Neuherbergstr. 11, 80937 München
- Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, Prof. Dr. Stephan Günther, Bernhard-Nocht-Str. 74, 20359 Hamburg
- Philipps-Universität Marburg, Institut für Virologie, Prof. Dr. Stephan Becker, Hans-Meerwein-Str. 2, 35043 Marburg

Andere Labore haben gegebenenfalls auch die Diagnostik auf Pockenviren etabliert, dieses muss dann im Bedarfsfall individuell beim jeweiligen Labor erfragt werden.

## Patientenversorgung

Eine ambulante Versorgung ist möglich, falls klinisch vertretbar, aber stets mit dem zuständigen Gesundheitsamt anzustimmen. Patientinnen und Patienten mit komplexen oder superinfizierten Läsionen und kritischen Lokalisationen bedürfen entsprechender -meist stationär verabreichter- Lokal- und Schmerztherapie, ggf. auch einer Antibiotikatherapie. Da variable Verläufe möglich sind, sollten die Erkrankten engmaschig beobachtet werden. Insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit Risiko für einen schweren Verlauf ist eine stationäre Vorstellung/Versorgung in erfahrenen infektiologischen Zentren zu erwägen. Eine Beratung bei komplexen klinischen Fällen ist z. B. über Zentren der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie

### Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

(DGI), der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und des STAKOB möglich (Kontakt: [www.rki.de/stakob](http://www.rki.de/stakob)).

## Isolierung

Die Isolierung von Erkrankten im ambulanten Setting ist angezeigt, wenn die Mpox-Läsionen (auch Schorf und Krusten) an Stellen nachweisbar sind, die im Alltag nicht mit fest sitzenden Pflastern oder Schutzverband abgedeckt werden können (z. B. Mundhöhle, Gesicht oder Hände) oder wenn Symptome einer Allgemeininfektion (z. B. Fieber, Kopf- oder Gliederschmerzen) bzw. respiratorische Symptome (Halsschmerzen, Husten) bestehen (siehe [www.rki.de/mpox-flussschema](http://www.rki.de/mpox-flussschema) bzw. [www.rki.de/mpox-ratgeber](http://www.rki.de/mpox-ratgeber)). Dies ist unabhängig von der Virus-Klade.

Dabei ist darauf zu achten, Kontakte der an Mpox erkrankten Personen zu besonders vulnerablen Gruppen (z. B. zu Personen mit geschwächtem Immunsystem, Schwangeren, Kindern unter 12 Jahren oder hochbetagte Personen) zu vermeiden, solange nicht abgeheilte Läsionen bzw. offene Wunden bestehen, unabhängig von ihrer Lokalisation und Abdeckbarkeit.

Eine Aufhebung der Isolierung ist möglich, wenn alle Läsionen, die nicht sicher abgedeckt werden können, abgeheilt sind bzw. wenn Schorf und Krusten abgefallen sind und sich eine neue Hautschicht gebildet hat.

In der stationären Versorgung werden Patientinnen und Patienten entsprechend der [KRINKO-Empfehlungen](#) isoliert.

Für die Versorgung von Patientinnen und Patienten im stationären Setting finden sich weitere Informationen auf der Seite des RKI: [www.rki.de/mpox-hygiene](http://www.rki.de/mpox-hygiene).

Anpassungen und Verfügung weiterer Hygienemaßnahmen je nach klinischem Verlauf sind in Abstimmung mit dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt im Einzelfall möglich (<https://www.rki.de/mein-gesundheitsamt>).

## Hinweise zur Therapie

### Supportive Therapie

Eine zentrale Rolle in der Behandlung von Mpox stellt supportive Therapie und symptomatische Behandlung dar (Thornhill et al., 2022; Patel et al., 2022; Philpott et al., 2022; siehe auch: CDC: [Clinical Considerations for Pain Management](#)).

Mpox verursacht häufig sehr starke Schmerzen und kann gefährdete anatomische Stellen wie die Genitalien und den Oropharynx betreffen. Die meisten stationären Einweisungen erfolgen aufgrund von Schmerzen (Thornhill et al., 2022; Patel et al., 2022; Philpott et al., 2022). Zur Schmerzbehandlung sollten systemische (z. B. Paracetamol, NSAR, Opioide, Gabapentin) und topische (z. B. topische Steroide, Zink-Schüttelmixturen und Anästhetika wie Lidocain) Therapeutika eingesetzt werden (siehe: [WHO: Clinical management and infection prevention and control for](#)

### Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

[monkeypox: Interim rapid response guidance, 10 June 2022.](#)).

Topische Anästhetika sollten mit Vorsicht auf offenen Läsionen angewendet werden. Stuhlweichmacher und warme Sitzbäder sollten bei Patientinnen und Patienten mit Proktitis erwogen werden. Systemische und lokale Antihistaminika können ebenso zur Symptomlinderung beitragen.

Oropharyngeale Manifestationen von Mpox können zu Tonsillenödem, Peritonsillarabszessen oder Epiglottitis führen und orale Nahrungs-, Flüssigkeits- und Medikamenteneinnahme beeinträchtigen (siehe: [UK Health Security Agency. Monkeypox outbreak: technical briefings](#)). Mundspülungen und orale Antiseptika (z. B. Chlorhexidin-Mundwasser) und Lokalanästhetika (z. B. Mundspülungen mit Lidocain) können eingesetzt werden. Auf ausreichende Nahrungs- und vor allem Flüssigkeitsaufnahme sollte geachtet werden. Ggf. kann eine intravenöse Flüssigkeitssubstitution notwendig sein.

Als Komplikationen können bakterielle Superinfektionen auftreten. Bakterielle Superinfektionen sollen nach Abnahme von diagnostischem Material antibiotisch behandelt werden (in der PALM-007-Studie in DR Kongo wurde allen Patienten mit Mpox Klade Ib Infektion prophylaktisch Cloxacillin verabreicht).

### Antivirale Therapie

Bis Mai 2026 war in Europa zur Mpox-Therapie bei Erwachsenen und Kindern ab 13 kg **Tecovirimat** (Siga Technologies) als einziges für diese Indikation verfügbares Arzneimittel zugelassen. Die Zulassung von [Tecovirimat](#) erfolgte auf Wirksamkeitsdaten aus Tiermodellen, da es zum Zeitpunkt der Zulassung keine klinischen Wirksamkeitsdaten bei Mpox gab. Mittlerweile gibt es randomisierte Studien und retrospektive Daten, die die Rolle von Tecovirimat bei Behandlung von Mpox in Frage stellen.

In der randomisierten Placebo-kontrollierten Studie (PALM007), die durch die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) in der Demokratischen Republik Kongo in Patientinnen und Patienten, die mit Mpox Klade I infiziert waren (N=597) durchgeführt wurde, hatte eine 14-tägige Therapie mit Tecovirimat keinen Einfluss auf die Dauer bis zur Heilung der Läsionen (definiert als Verkrustung oder Desquamation aller Läsionen) (PALM007 Writing Group, 2025). Bei Patientinnen und Patienten mit frühem Therapiebeginn (< 7 Tage nach Symptombeginn) und disseminierten Läsionen (> 100 Läsionen) zeigte sich ein statistisch nicht signifikanter Trend zugunsten von Tecovirimat mit Verkürzung der Zeit bis zur Heilung um einen Tag (von 8 Tagen auf 7 Tage).

Auch in der durch die NIH durchgeführten, internationalen multizentrischen STOMP-Studie, die bei mit Mpox Klade II infizierten Patientinnen und Patienten (N=344) während des Ausbruchs 2022 durchgeführt wurde, wurde im Vergleich zu Placebo kein Einfluss der Tecovirimat-Therapie auf die Schmerzsymptomatik und Dauer bis zur

### Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

Heilung der Läsionen gesehen. Auch die Virus-Clearance wurde unter der antiviralen Therapie nicht beschleunigt (Zucker et al., 2026).

Der Hauptkritikpunkt an den beiden Studien ist, dass Tecovirimat Studiendesignbedingt zu spät im Krankheitsverlauf eingesetzt wurde. In der STOMP-Studie waren es median 8 Tage (6-10), nur 25% der eingeschlossenen Patienten erhielten die antivirale Behandlung < 5 Tage nach Symptombeginn. Trotzdem war der Anteil der Patienten mit klinischer Abheilung der Läsionen bis zum Tag gleich in der Tecovirimat- und Placebo-Gruppe, unabhängig davon, ob die Behandlung vor oder nach 3 bzw. 5 Tagen nach Symptombeginn eingeleitet wurde. Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen der PALM007-Studie, in der Ebenfalls die Zeit bis zur Abheilung der Läsionen nicht verkürzt war, wenn die antivirale Therapie mit Tecovirimat innerhalb von 4 Tagen nach Symptombeginn begonnen wurde (PALM007 Writing Group, 2025).

Bei der Bewertung der Ergebnisse beider Studien sind die Charakteristika der untersuchten Kohorten zu berücksichtigen, die insbesondere für die PALM-007-Studie von den Charakteristika der Erkrankten in Deutschland abweichen, für die eine antivirale Therapie diskutiert wird. Die in die PALM007-Studie eingeschlossene Population bestand zu 64% aus Kindern, zumeist unter 13 Jahren, für die in der EU keine Zulassung besteht. Die meisten Erkrankten hatten eine schwere (>100 Läsionen) oder eine sehr schwere (>250 Läsionen) disseminierte Infektion entsprechend der WHO-Schweregrade für Mpox (siehe: [WHO: Clinical management and infection prevention and control for monkeypox: Interim rapid response guidance, 10 June 2022](#)). Während Mangelernährung und Malaria häufige Begleiterkrankungen waren, hatte ein sehr kleiner Anteil (0,6%) der in die Studie eingeschlossenen Personen eine HIV-Infektion (CD4+ Zellzahl unbekannt). Es fehlen Informationen zu eventuell vorhandenen weiteren Immundefekten in der rekrutierten Kohorte.

In der STOMP-Studie hatten 35% der eingeschlossenen Personen eine HIV-Infektion als Komorbidität. Personen mit CD4+ Zellzahl <200/µl wurden allerdings *Open Label* mit Tecovirimat behandelt, was den Vergleich mit der Placebo-Gruppe verhindert. Auch anderweitig schwer immunsupprimierte, schwer erkrankte oder schwangere Personen wurden alle mit Tecovirimat behandelt, so dass es für diese Gruppe keine vergleichenden Wirksamkeitsdaten gibt (Zucker et al., 2026).

Die präliminären Daten aus einer weiteren multizentrischen randomisierten kontrollierten Studie (UNITY trial, [NCT05597735](#)) bestätigen die Ergebnisse der PALM007 und STOMP-Studien. Der Einsatz von Tecovirimat blieb ohne Einfluss auf die Zeit bis zum vollständigen Abklingen der Läsionen, unabhängig von der analysierten Subgruppe – einschließlich Alter, HIV-Status, Anzahl der Läsionen und Symptomdauer ([UNITY Trial, Press release 2025](#)). Die Ergebnisse der EPOXI trial ([NCT06156566](#)) wurden bislang noch nicht ausgewertet.

Die Daten aus dem Extended Access (EA)-Programm der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in dessen Rahmen in den USA zwischen Mai 2022 und Juni 2023 über 7100 an Mpox Klade IIb Erkrankte mit Tecovirimat behandelt wurden, erlauben aufgrund einer fehlenden Vergleichsgruppe keine

#### **Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,**

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

Aussage zur Effektivität (Yu et al., 2024). Zu den häufigsten Indikationen für die antivirale Therapie gehörten kritische Lokalisationen der Läsionen, Schmerzen und Risikofaktoren für einen komplizierten Verlauf (darunter schwere Immunsuppression). Die meisten Patientinnen und Patienten waren nach 14-tägiger Therapie mit Tecovirimat genesen, entsprechend dem natürlichen Krankheitsverlauf von meistens 2 bis 4 Wochen (Ogoina et al., 2023). Allerdings wurden auch prolongierte und schwere Verläufe einschließlich Tod unter schwer immunsupprimierten Personen beobachtet. Die Krankheitsverläufe bei Personen mit HIV und CD4+ Zellen  $>200/\mu\text{l}$  unterschieden sich nicht von den Krankheitsverläufen bei der Gesamtpopulation.

Zum Einfluss einer Behandlung auf die Narbenbildung gibt es bisher keine konsistenten publizierten Daten. Fallberichte und -serien aus dem Mpox Klade IIb Ausbruch 2022 liefern dazu widersprüchliche Ergebnisse (Karmarkar et al., 2022; Mazzotta et al., 2023).

Basierend auf den Ergebnissen klinischer Studien, die die Wirksamkeit von Tecovirimat bei der Behandlung von Mpox nicht bestätigen konnten, wurde im März 2026 der Einsatz des Medikaments von der CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) der EMA (European Medicines Agency) neu bewertet. Das Komitee kam zum Schluss, dass aufgrund von fehlender Wirksamkeit Tecovirimat zur Behandlung von Mpox bei immunkompetenten Personen nicht mehr eingesetzt werden sollte. Neue Sicherheitsbedenken gab es nicht ([EMA, 2026](#)). Diese Bewertung führte anschließend zu einer Einschränkung der Zulassung auf die Behandlung von Pocken, Kuhpocken und Komplikationen nach Impfung mit Vaccinia-Virus ([Tecovirimat: Summary of Product Characteristics, 2026](#)). In Deutschland wurde für Tecovirimat ein „[Rote-Hand-Brief](#)“ veröffentlicht.

**In Zusammenschau der vorhandenen Evidenz ist auch nach der Meinung der Expertinnen und Experten des STAKOB eine spezifische antivirale Therapie mit Tecovirimat bei einer bestätigten Mpox-Infektion bei immunkompetenten Personen nicht indiziert. Der Einsatz bei relevanter Immundefizienz, z. B. bei stattgehabter Organ- oder Stammzelltransplantation, sowie bei Vorliegen einer nicht (effektiv) therapierten HIV-Infektion mit CD4-Zellzahl  $<200/\mu\text{l}$  oder bei schwerem Verlauf kann insbesondere früh nach Symptombeginn in Ermangelung von Alternativen als Einzelfallentscheidung diskutiert werden, wobei es hierzu überzeugende Wirksamkeitsdaten fehlen**

Es ist zu beachten, dass es Hinweise auf eine verminderte Wirksamkeit von Tecovirimat bei Immuninsuffizienz im Tiermodell gibt.

Darüber hinaus wurden aber v.a. bei prolongierter oder wiederholter Anwendung, z. B. bei schwerer Immunsuppression oder bei nicht zuverlässiger Einnahme mit hochkalorischer, fettreicher Nahrung, Resistenzen gegenüber Tecovirimat beschrieben. Dies sollte bei der Indikationsstellung und der Beratung der Patientinnen und Patienten berücksichtigt werden (Smith et al., 2023; Garrigues et al., 2023). Zur Resistenzentwicklung bei Klade I bzw. Ib liegen derzeit keine publizierten Daten vor.

#### **Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,**

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

**Wichtiger Hinweis:**

Aktuell ist Tecovirimat in Deutschland in begrenzter Menge weiterhin verfügbar. Sollte aus Sicht des behandelnden Arzt / der behandelnden Ärztin ein individueller Therapieversuch mit Tecovirimat trotz fehlenden Wirksamkeitsdaten aus klinischen Studien sinnvoll erscheinen, wird geraten, mit dem regional zuständigen STAKOB-Behandlungszentrum ([www.rki.de/stakob](http://www.rki.de/stakob)) Kontakt zur Beratung aufzunehmen und ggf. den Zugang zum Medikamenten zu erhalten. Alternativ kann die STAKOB-Geschäftsstelle kontaktiert werden ([STAKOB@rki.de](mailto:STAKOB@rki.de)).

Für die weiteren zur antiviralen Behandlung von Mpox in Frage kommenden Substanzen liegen ebenfalls kein sicherer Wirksamkeitsnachweis und somit auch keine Zulassung und Therapieempfehlung vor.

Bei fulminantem Verlauf kann die Anwendung humaner Vaccinia-Immunglobuline erwogen werden. **Vaccinia-Immunglobulin (VIGIV)**, Emergent Biosolution) ist zur Behandlung von Komplikationen der klassischen Pockenimpfung in den USA zugelassen. Bis auf wenige Fallberichte liegen bislang keine systematisch erhobenen Daten zur Behandlung oder Prophylaxe von Mpox vor, ebenso wenig Daten für Schwangere, Kinder und Personen >65 Jahre (Karki et al., 2025; Thet et al., 2023). Dennoch empfiehlt die CDC, dass bei Patienten mit schweren T-Zell-Defekten, bei denen eine Impfung kontraindiziert ist, eine Behandlung und auch eine prophylaktische Gabe mit dem Vaccinia-Immunglobulin erwogen wird (siehe: [CDC: Clinical Treatment for Mpox](#)). Vaccinia-Immunglobulin (VIGIV) der Fa. Emergent ist aktuell in Deutschland nicht verfügbar.

Als weitere Substanz hat **Brincidofovir (Tembexa)**, Emergent Biosolution), ein Lipidkonjugat von Cidofovir, in den USA eine Zulassung für die Therapie der Pocken (Variola major). In-vitro- sowie tierexperimentelle Daten lassen auf eine Wirksamkeit bei Mpox schließen, ebenfalls auf Synergismus bei gleichzeitiger Gabe von Brincidofovir und Tecovirimat bei anderen Orthopoxvirus-Infektionen (Hutson et al., 2021; Prevost et al., 2024; Quenelle et al., 2007; Stabenow et al., 2010;). Bis auf wenige Fallberichte liegen allerdings zum Einsatz bei Mpox keine Daten aus klinischen Studien vor (Adler et al., 2022; Alameer et al., 2024; McCarty et al., 2025;). In der DR Kongo wird derzeit eine randomisierte kontrollierte Studie durchgeführt, in der u.a. die Wirksamkeit von Brincidofovir bei der Behandlung von Mpox untersucht wird (siehe: [Africa CDC: Pressemeldung](#)). Aufgrund der erhöhten Toxizität (v.a. Lebertoxizität) sollte die Indikation streng gestellt werden. z. Der Einsatz ist auch bei signifikantem Progress der Erkrankung zu erwägen (siehe: [CDC: Clinical Treatment for Mpox](#)). Eine Kombinationstherapie kann bei schweren Fällen diskutiert werden.

Für die topische Behandlung von Mpox-Keratitis und -Konjunktivitis empfiehlt die CDC trotz limitierter Wirksamkeitsdaten **Trifluridin**, üblicherweise eingesetzt zur

**Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,**

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

Behandlung von Herpes-simplex-Keratitis und okulärer Vaccinia-Virus-Infektion (siehe: [CDC: Clinical Treatment for Mpox](#)).

Diese weiteren Substanzen sind derzeit nur sehr eingeschränkt oder gar nicht verfügbar, so dass Einbindung der Behandlungszentren des STAKOB sowie der Zentren der DGI und DPGI für Beratungen und Falldiskussionen empfohlen wird.

## Prophylaxe

### Impfstoff

Zur Impfung gegen Pocken (*Variola major*) steht in den Ländern der EU mit dem Impfstoff [Imvanex®](#) der Fa. Bavarian Nordic ein bereits 2013 zugelassener Impfstoff der 3. Generation zur Verfügung, der auf dem modifizierten Vacciniavirus Ankara (MVA) basiert. Es konnte eine Kreuzimmunität zu Mpox gezeigt werden, so dass von einer Wirksamkeit unabhängig von der vorliegenden Virus-Klade ausgegangen wird.

Die Zulassung von Imvanex® in Europa wurde im Juli 2022 um die Prophylaxe von Mpox bei Erwachsenen und seit September 2024 bei Jugendlichen  $\geq 12$  Jahre erweitert. In den USA (JYNNEOS®) und in Kanada (Imvamune®) ist ein MVA-Impfstoff von Bavarian Nordic ebenfalls zur Prophylaxe von Mpox zugelassen, wird aber unter anderem Namen vermarktet und entspricht auch nicht vollständig der in Europa zugelassenen Vakzine. Für den Einsatz bei Kindern  $< 12$  Jahre gibt es bisher keine Zulassung.

Beim MVA-Impfstoff handelt es sich um einen subkutan zu verabreichenden Lebendimpfstoff, der jedoch keine im Menschen replikationsfähigen Viren enthält, so dass der Einsatz auch bei immunsupprimierten Personen möglich ist. Ein vollständiger Impfschutz besteht nach zweimaliger Gabe im Abstand von mindestens 28 Tagen. Pocken-vakzinierten Personen wird eine Auffrischimpfung empfohlen. Dabei sollen immungeschwächte Personen (z.B. solche mit unbehandelter HIV-Infektion), die zuvor bereits gegen Pocken geimpft wurden, zwei Auffrischimpfungen erhalten.

Der Impfstoff Imvanex® ist in Deutschland über den Großhandel verfügbar.

In den USA wurde Ende August 2024 ein Pockenimpfstoff der 2. Generation ([ACAM2000](#)) zugelassen. Nach Expertenmeinung sollten jedoch die Pockenimpfstoffe der 1. und 2. Generation (Dryvax, ACAM2000) aufgrund ihres ungünstigen Nebenwirkungsprofils zur Prophylaxe von Mpox nicht mehr angewendet werden.

### Wirksamkeit von MVA-Impfstoff in der Prä-Expositionsprophylaxe (Indikationsimpfung)

In einer Meta-Analyse aus randomisierten kontrollierten Studien, aber auch retrospektiven Kohorten, Fallserien und -berichten wurde eine Effektivität des Impfstoffes bei 76 % (95%CI 64 - 88 %) bei einmaliger Verabreichung und 82 % (95%CI 72 - 92 %) nach zwei Gaben berichtet (Pischel et al., 2024). In der retrospektiven Beobachtungsstudie TEMVac lag die Effektivität der Impfung, gemessen 14 Tage oder später nach der ersten Impfdosis, bei 57,8% (95% CI 11,8 –

#### Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

83,0) in der Gesamtkohorte und bei 84,1% (42,0 - 100) bei Personen ohne vorliegende HIV-Infektion. Bei HIV-Infizierten war die Effektivität deutlich geringer und lag bei 34,9% (-72,8 – 79,0). Durchbruchinfektionen hatten bei Geimpften einen milderen Verlauf im Vergleich zu Mpox-Verläufen bei Ungeimpften (Hillus et. al., 2025).

### Wirksamkeit von MVA-Impfstoff in der Postexpositionsprophylaxe

Daten zum Einsatz einer Impfung mit dem MVA-Impfstoff als Postexpositionsprophylaxe aus größeren klinischen Studien fehlen bisher. In einer Meta-Analyse aus randomisierten kontrollierten Studien, aber auch retrospektiven Kohorten, Fallserien und -berichten erwies sich die postexpositionelle Impfung nur zu 20% (95%CI -24 – 65%) wirksam in der Verhinderung von Mpox. Dies könnte aber durch den Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs zur Postexpositionsprophylaxe (PEP) beeinflusst worden sein, der in mehreren Studien 7 bis 8 Tage nach Exposition betrug (Pischel et al., 2024). Dennoch wird der frühzeitigen Anwendung (< 4 Tage nach Exposition) laut Expertenmeinung eine Wirksamkeit gegen Mpox zugeschrieben ([WHO 2022](#); [CDC 2026](#)).

### Aktuelle Impfeempfehlung (Indikationsimpfung und Postexpositionsprophylaxe)

Empfehlungen zum **Einsatz von Imvanex®/JYNNEOS® für die Indikationsimpfung von Personen mit einem erhöhten Expositions- und Infektionsrisiko** wurden von der Ständigen Impfkommission (STIKO) erarbeitet und zuletzt im [Epidemiologischen Bulletin 29/2025](#) in aktualisierter Fassung veröffentlicht. Demnach wird die Impfung z. B. Männern, trans- und nicht-binären Personen, die Sex mit Männern haben [MSM] und häufig den Partner wechseln sowie Sexarbeitenden empfohlen. Die berufliche Indikation umfasst Ausübung von gezielten Tätigkeiten mit MPXV gemäß Biostoffverordnung (z. B. in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien).

Zum aktuellen Zeitpunkt ist zwar noch keine abschließende Aussage über den Stellenwert der Impfung möglich, das beobachtete Eindämmen des weltweiten Ausbruchs mit der Klade IIb könnte dennoch u.a. auch auf die erfolgreiche Impfkampagne zurückgeführt werden.

Prioritär sollte die **Postexpositionsprophylaxe (PEP) exponierten Kontaktpersonen nach Hochrisiko-Kontakt** angeboten werden (Tabelle 2).

Dazu gehören

- enge körperliche Kontakte über nicht intakte Haut oder über Schleimhäute (z. B. sexuelle Kontakte, zwischenmenschliche Kontakte von Haushaltsangehörigen) oder längerer ungeschützter face-to-face-Kontakt < 1m mit einer an Mpox erkrankten Person (z. B. Haushaltskontakte) und nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material (z. B. Kleidung oder Bettwäsche von Erkrankten);
- enger Kontakt ohne ausreichende persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, medizinischer Mund-Nasen-Schutz/FFP2-Maske und Schutzkittel) zu einer

#### Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

Person mit einer bestätigten Mpox-Erkrankung, ihren Körperflüssigkeiten oder zu kontaminiertem potenziell infektiösem Material in der medizinischen Versorgung;

- akzidentell ungeschützter Kontakt von Personal in Laboratorien zu Laborproben, die nicht inaktiviertes MPXV-haltiges Material enthalten; insbesondere, wenn Virusanreicherungen in Zellkulturen vorgenommen werden.

### Wichtiger Hinweis:

Um die Ausbreitung von Mpox weiterhin einzudämmen, ist eine hohe Impfquote in den Indikationsgruppen erforderlich. Die Komplettierung begonnener Impfserien durch eine 2. Impfstoffdosis wird dringend empfohlen.

Auch bisher noch nicht geimpfte besonders gefährdete Personen sollten das Impfangebot mit 2 Impfstoffdosen baldmöglichst wahrnehmen, um dauerhaft geschützt zu werden ([siehe STIKO-Empfehlungen](#)). Impfungen in den durch die aktuellen Ausbrüche durch die Klade Ia bzw. Ib betroffenen Ländern erscheinen erforderlich, um auch diese Ausbrüche zu beenden und die Eintragung in weitere Länder zu verhindern.

**Tabelle 1: Postexpositionsprophylaxe und Indikationsimpfung mit modifizierten Vacciniavirus Ankara (MVA)-Impfstoff (Imvanex®)**

<b>Postexpositionsprophylaxe</b> (frühestmöglich* bis max. 14 Tage nach Hochrisiko-Exposition):	<b>Indikationsimpfung</b> (Personen mit erhöhtem Expositions- und Infektionsrisiko):
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personen im Alter <math>\geq 12</math> Jahre (auch Immunsupprimierte)</li> <li>▪ Frühestmöglich in einem Zeitraum von bis zu 14 Tagen nach Exposition</li> <li>▪ Wenn indiziert, Vervollständigung der Grundimmunisierung durch eine 2. Impfstoffdosis nach <math>\geq 28</math> Tagen,               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ einmalige Gabe bei Personen, die in der Vergangenheit gegen Pocken (Variola major) geimpft worden sind</li> <li>○ bei Immunsuppression 2 Gaben)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personen im Alter <math>\geq 12</math> Jahre (auch Immunsupprimierte)</li> <li>▪ 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 28 Tagen</li> <li>▪ Einmalige Gabe bei Personen, die in der Vergangenheit gegen Pocken (Variola major) geimpft worden sind (bei Immunsuppression 2 Gaben)</li> </ul>

\*Gabe  $\leq 4$  Tage nach Exposition kann eine Infektion verhindern ([WHO 2022](#); [CDC 2026](#)).

### Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

Die Gabe von **humanem Vaccinia-Immunglobulin** oder **Tecovirimat** kann bei Personen mit erwarteter eingeschränkter Impfantwort als PEP nach Hochrisikoexposition erwogen werden, wobei hierzu keine Evidenz aus klinischen Studien vorliegt und die Rationale dafür lediglich auf den theoretischen Überlegungen über die antivirale Wirksamkeit bei frühzeitigem Einsatz basiert. Vaccinia-Immunglobulin (VIGIV) der Fa. Emergent ist aktuell in Deutschland nicht verfügbar.

## Literaturverzeichnis

Adebisi YA, Ezema SM, Bolarinwa O, et al. Sex Workers and the Mpox Response in Africa. *J Infect Dis.* 2024 Oct 16;230(4):786-788. doi: 10.1093/infdis/jiae435. PMID: 39207207.

Adler H, Gould S, Hine P, et al. Clinical features and management of human monkeypox: a retrospective observational study in the UK. *Lancet Infect Dis.* 2022;22(8):1153–1162.

Alameer RM, Yamani A, Al-Saud A, et al. The successful treatment of mpox with brincidofovir in renal transplant recipients—a report of 2 cases. *Int J Inf Dis.* 2024;143:107015.

Americo JL, Earl PL, Moss B: Virulence differences of mpox (monkeypox) virus clades I, IIa, and IIb.1 in a small animal model. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2023 Feb 21; 120(8): e2220415120. DOI: 10.1073/pnas.2220415120

Angelo KM, Smith T, Camprubi-Ferrer D, et al., GeoSentinel Network C. Epidemiological and clinical characteristics of patients with Monkeypox in the geosentinel network: a cross-sectional study. *Lancet Infect Dis.* 2023; 23(2):196–206.

Badenoch JB, Conti I, Rengasamy ER, et al. Neurological and psychiatric presentations associated with human Monkeypox virus infection: A systematic review and meta-analysis. 2022; *EClinicalMedicine* 52:101644.

Brosius I, Vakaniaki EH, Mukari G, et al. Epidemiological and clinical features of mpox during the clade Ib outbreak in South Kivu, Democratic Republic of the Congo: a prospective cohort study. *Lancet.* 2025 Feb 15;405(10478):547-559. doi: 10.1016/S0140-6736(25)00047-9. Epub 2025 Jan 29. PMID: 39892407; PMCID: PMC7618259.

Bugeme PM, Bugale PK, Mukika TF, et al. Community transmission of mpox clade Ib not driven through sexual exposures, Uvira, eastern Democratic Republic of the Congo, June to October 2024. *Euro Surveill.* 2025 Dec;30(50):2500280. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2025.30.50.2500280. PMID: 41414936; PMCID: PMC12719941.

Bunge EM, Hoet B, Chen L, et al. The changing epidemiology of human monkeypox-A potential threat? A systematic review. *PLoS Negl Trop Dis.* 2022 Feb 11;16(2): e0010141. doi: 10.1371/journal.pntd.0010141. PMID: 35148313; PMCID: PMC8870502.

Cho W, Park S, Kim HJ, et al. Clinical characteristics and outcomes of patients with mpox during the 2022 mpox outbreak compared with those before the outbreak: A systematic review and meta-analysis. *Rev Med Virol.* 2024 Jan;34(1):e2508. doi: 10.1002/rmv.2508. PMID: 38282393.

D'Antonio F, Pagani G, Buca D, et al. Monkeypox infection in pregnancy: a systematic review and metaanalysis. *Am J Obstet Gynecol MFM.* 2023 Jan;5(1):100747. doi: 10.1016/j.ajogmf.2022.100747. Epub 2022 Sep 9. PMID: 36096413; PMCID: PMC9555294.

### Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

- DeWitt ME, Polk C, Williamson J, et al. Global Monkeypox case hospitalisation rates: A rapid systematic review and meta-analysis. 2022; *EClinicalMedicine* 54:101710
- Garrigues JM, Hemarajata P, Espinosa A, et al. Community spread of a human monkeypox virus variant with a tecovirimat resistance-associated mutation. *Antimicrob Agents Chemother*. 2023 Nov 15;67(11):e0097223. doi: 10.1128/aac.00972-23. Epub 2023 Oct 12. PMID: 37823631; PMCID: PMC10649028.
- Gessain A, Nakoune E, Yazdanpanah Y. Monkeypox. *N. Engl. J. Med*. 2022, 387, 1783–1793
- Guagliardo SAJ, Smith T, Hamer DH, et al., GeoSentinel Network C. Analysis of Monkeypox virus exposures and lesions by anatomic site. 2024; *Emerg Infect Dis* 30(11):2381–2384.
- Halani S, Cai S, Zanoria C, et al. Myocarditis and Pericarditis as a Complication of Mpox: Case Series and Literature Review. *Sex Transm Dis*. 2026 Jan 1;53(1):59-66. doi: 10.1097/OLQ.0000000000002237. Epub 2025 Sep 9. PMID: 41359790
- He GS, Tay SS, Tan BJ, et al. Monkeypox infections: seizures and encephalitis. *QJM*. 2023 Apr 29;116(4):267-270. doi: 10.1093/qjmed/hcac192. PMID: 35961048.
- Hillus D, Le NH, Tober-Lau P, et al. Safety and effectiveness of MVA-BN vaccination against mpox in at-risk individuals in Germany (SEMVAc and TEMVAc): a combined prospective and retrospective cohort study. *Lancet Infect Dis*. 2025 Jul;25(7):775-787. doi: 10.1016/S1473-3099(25)00018-0. Epub 2025 Mar 18. PMID: 40118087.
- Hutson CL, Kondas AV, Mauldin MR, et al. Pharmacokinetics and efficacy of a potential smallpox therapeutic, brincidofovir, in a lethal Monkeypox virus animal model. 2021; *mSphere* 6(1).
- Karki A, Acharya A, Shrestha S, et al. A Case of Severe Mpox and Bartonella Co-infection in a Patient Living With Human Immunodeficiency Virus (HIV). *Cureus*. 2025 Oct 9;17(10):e94219. doi: 10.7759/cureus.94219. PMID: 41216051; PMCID: PMC12597121.
- Karmarkar EN, Golden MR, Kerani RP, et al. Association of Tecovirimat Therapy With Mpox Symptom Improvement: A Cross-sectional Study-King County, Washington, May-October 2022. *Open Forum Infect Dis*. 2024 Jan 22;11(3):ofae029. doi: 10.1093/ofid/ofae029. PMID: 38456195; PMCID: PMC10919389.
- Liu Q, Fu L, Wang B, et al. Clinical Characteristics of Human Mpox (Monkeypox) in 2022: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Pathogens*. 2023 Jan 15;12(1):146. doi: 10.3390/pathogens12010146. PMID: 36678494; PMCID: PMC9861547.
- Masirika LM, UDAHemuka JC, Ndishimye P et al. Epidemiology, clinical characteristics, and transmission patterns of a novel Mpox (Monkeypox) outbreak in eastern Democratic Republic of the Congo (DRC): an observational, cross-sectional cohort study. medRxiv preprint: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.03.05.24303395v1> (zuletzt aufgerufen am 25.01.2026)

#### **Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,**

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

Mazzotta V, Cozzi-Lepri A, Lanini S, et al. Effect of tecovirimat on healing time and viral clearance by emulation of a target trial in patients hospitalized for mpox. *J Med Virol*. 2023 Jun;95(6): e28868. doi: 10.1002/jmv.28868. PMID: 37306318.

McCarty J, Cassie D, Kodihalli S, et al. Brincidofovir in the Era of Mpox. *Expert Rev Anti Infect Ther*. 2025 Sep;23(9):781-796. doi: 10.1080/14787210.2025.2532029. Epub 2025 Jul 20. PMID: 40652312.

Mitja O, Alemany A, Marks M, et al.; Group S-Nw. Mpox in people with advanced HIV infection: a global case series. 2023: *Lancet* 401(10380):939–949

Nitsche A, Schrick L, Schaade L. Infektionen des Menschen mit Affenpocken. *Flug u Reisemed* 2019; 26: 18–24

Nzoyikorera N, Nduwimana C, Schuele L, et al. Monkeypox Clade Ib virus introduction into Burundi: first findings, July to mid-August 2024. *Euro Surveill*. 2024 Oct;29(42):2400666. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2024.29.42.2400666. PMID: 39421956; PMCID: PMC11487920.

Nolen LD, Osadebe L, Katomba J, et al. Extended Human-to-Human Transmission during a Monkeypox Outbreak in the Democratic Republic of the Congo. *Emerg Infect Dis*. 2016 Jun;22(6):1014-21. doi: 10.3201/eid2206.150579. Erratum in: *Emerg Infect Dis*. 2016 Oct;22(10). doi: 10.3201/eid2210.C22210. PMID: 27191380; PMCID: PMC4880088.

Ogoina D, Damon I, Nakoune E. Clinical review of human mpox. *Clin Microbiol Infect* 2023; 29:1493–1501. DOI: 10.1016/j.cmi.2023.09.004.

PALM007 Writing Group; Ali R, Alonga J, et al. Tecovirimat for Clade I MPXV Infection in the Democratic Republic of Congo. *N Engl J Med*. 2025 Apr 17;392(15):1484-1496. doi: 10.1056/NEJMoa2412439. PMID: 40239067.

Patel A, Bilinska J, Tam J C H, et al. Clinical features and novel presentations of human monkeypox in a central London centre during the 2022 outbreak: descriptive case series. *BMJ*2022;378: e072410.

Philpott D, Hughes CM, Alroy KA, et al. Epidemiologic and Clinical Characteristics of Monkeypox Cases — United States, May 17–July 22, 2022. *MMWR Morb Mortal Rep*. ePub: 5 August 2022.

Pischel L, Martini BA, Yu N, et al. Vaccine effectiveness of 3rd generation mpox vaccines against mpox and disease severity: A systematic review and meta-analysis. *Vaccine*. 2024 Nov 14;42(25):126053. doi: 10.1016/j.vaccine.2024.06.021. Epub 2024 Jun 21. PMID: 38906763.

Prasad S, Galvan Casas C, Strahan AG, et al. A dermatologic assessment of 101 mpox (monkeypox) cases from 13 countries during the 2022 outbreak: Skin lesion morphology, clinical course, and scarring. *J Am Acad Dermatol*. 2023 May;88(5):1066-1073. doi: 10.1016/j.jaad.2022.12.035. Epub 2023 Jan 11. PMID: 36641010; PMCID: PMC9833815.

#### **Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,**

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

Prevost J, Sloan A, Deschambault Y, et al. Treatment efficacy of cidofovir and brincidofovir against clade II Monkeypox virus isolates. *Anti Res.* 2024 Nov;231:105995.

Quenelle DC, Prichard MN, Keith KA, et al. Synergistic efficacy of the combination of ST-246 with CMX001 against orthopoxviruses. *Antimicrob Agents Chemother.* 2007 Nov;51(11):4118-24. doi: 10.1128/AAC.00762-07. Epub 2007 Aug 27. PMID: 17724153; PMCID: PMC2151443

Reynolds MG, Yorita KL, Kuehnert MJ, et al. Clinical manifestations of human Monkeypox influenced by route of infection. 2006; *J Infect Dis* 194(6):773–780.

Rojas-Carabali W, Cifuentes-González C, Agrawal R, de-la-Torre A. Spectrum of ophthalmic manifestations in monkeypox virus infection worldwide: Systematic review and meta-analysis. *Heliyon.* 2023 Jul 22;9(8):e18561. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18561. PMID: 37576249; PMCID: PMC10413003.

Quenelle DC, Prichard MN, Keith KA, et al. Synergistic efficacy of the combination of ST-246 with CMX001 against orthopoxviruses. *Antimicrob Agents Chemother.* 2007 Nov;51(11):4118-24. doi: 10.1128/AAC.00762-07. Epub 2007 Aug 27. PMID: 17724153; PMCID: PMC2151443.

Sanchez Clemente N, Coles C, Paixao ES, et al. 2024. Paediatric, maternal, and congenital mpox: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Glob Health* 12(4):e572–e588.

Sharif N, Alzahrani KJ, Halawani IF, et al. Molecular epidemiology, transmission and clinical features of 2022-mpox outbreak: A systematic review. *Health Sci Rep.* 2023 Oct 5;6(10):e1603. doi: 10.1002/hsr2.1603. PMID: 37808926; PMCID: PMC10556267.

Smith TG, Gigante CM, Wynn NT, et al. Tecovirimat Resistance in Mpox Patients, United States, 2022–2023. *Emerg Infect Dis.* 2023;29(12):2426-2432.

Stabenow J, Buller RM, Schriewer J, et al. A mouse model of lethal infection for evaluating prophylactics and therapeutics against Monkeypox viruses. *J Virol.* 2010;84(8):3909–3920.

Tarin-Vicente EJ, Alemany A, Agud-Dios M, et al. Clinical presentation and virological assessment of confirmed human Monkeypox virus cases in Spain: a prospective observational cohort study. 2022; *Lancet* 400(10353):661–669

Thet AK, Kelly PJ, Kasule SN, et al. The use of vaccinia immune Globulin in the treatment of severe mpox. virus infection in human immunodeficiency virus/aids. 2023; *Clin Infect Dis* 76(9):1671–1673.

Thornhill JP, Barkati S, Walmsley S, et al. SHARE-net Clinical Group. Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries - April-June 2022. *N Engl J Med.* 2022 Aug 25;387(8):679-691. doi: 10.1056/NEJMoa2207323. Epub 2022 Jul 21. PMID: 35866746

Ulaeto D, Agafonov A, Burchfield J, et al. New nomenclature for mpox (monkeypox) and monkeypox virus clades. *Lancet Infect Dis.* 2023 Mar;23(3):273-275. doi: 10.1016/S1473-3099(23)00055-5. Epub 2023 Feb 6. PMID: 36758567; PMCID: PMC9901940.

#### **Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,**

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

Vaughan A, Aarons E, Astbury J, et al. Human-to-Human Transmission of Monkeypox Virus, United Kingdom, October 2018. *Emerg Infect Dis.* 2020 Apr;26(4):782-785. doi: 10.3201/eid2604.191164. Epub 2020 Apr 17. PMID: 32023204; PMCID: PMC7101111.

Wilkin et al. Tecovirimat Is Safe but Not Efficacious in People with Clade II Mpox. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections in San Francisco, California. Wednesday, March 12, 2025.

Yon H, Shin H, Shin JI, et al. Clinical manifestations of human Mpox infection: A systematic review and meta-analysis. *Rev Med Virol.* 2023 Jul;33(4):e2446. doi: 10.1002/rmv.2446. Epub 2023 Apr 13. PMID: 37056203.

Yu PA, Elmor R, Muhammad K, et al. Tecovirimat Use under Expanded Access to Treat Mpox in the United States, 2022-2023. *NEJM Evid.* 2024 Oct;3(10):EVIDoA2400189. doi: 10.1056/EVIDoA2400189. Epub 2024 Sep 13. PMID: 39270215; PMCID: PMC11421955.

Zong Y, Kamoi K, Zhang J, Yang M, Ohno-Matsui K. Mpox (Monkeypox) and the Eye: Ocular Manifestation, Diagnosis, Treatment and Vaccination. *Viruses.* 2023 Feb 23;15(3):616. doi: 10.3390/v15030616. PMID: 36992325; PMCID: PMC10054449.

Zucker J, Fischer WA 2nd, Zheng L, et al; STOMP/A5418 Investigators. Tecovirimat for the Treatment of Mpox. *N Engl J Med.* 2026 Feb 26;394(9):884-895. doi: 10.1056/NEJMoa2506495. PMID: 41740032.

### Weitere Quellen:

[www.rki.de/mpox](http://www.rki.de/mpox) (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

Africa CDC Enrollment starts in Africa CDC-LED mpox therapeutic study (MOSA) Pressemitteilung [31-Aug-2025]. <https://africacdc.org/news-item/enrollment-starts-in-africa-cdc-led-mpox-therapeutic-study-mosa/> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

Beschluss der STIKO für die Empfehlung zur Impfung gegen Affenpocken mit Imvanex (MVA-Impfstoff). *EpiBull* 25/26 | 2022, <https://doi.org/10.25646/10213> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

CDC: Clinical Considerations for Pain management. <https://www.cdc.gov/mpox/hcp/clinical-care/pain-management.html> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

CDC: Clinical Treatment for Mpox. <https://www.cdc.gov/monkeypox/hcp/clinical-care/index.html> (zuletzt aufgerufen am 01.07.2026)

CDC: Vaccine for Mpox Prevention in the United States. Stand: 10.03.2026 <https://www.cdc.gov/monkeypox/hcp/vaccine-considerations/index.html> (zuletzt aufgerufen am 01.07.2026)

CDC: Rapid risk assessment, acute event of potential public health concern. Version

### Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

6.0, 07 February 2026. [https://cdn.who.int/media/docs/default-source/sage-2026/who-rapid-risk-assessment---mpox---global---version-61f51081e-3348-4c79-a943-83c7b9858f9a.pdf?sfvrsn=904b2754\\_1&download=true](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/sage-2026/who-rapid-risk-assessment---mpox---global---version-61f51081e-3348-4c79-a943-83c7b9858f9a.pdf?sfvrsn=904b2754_1&download=true) (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

European Medicines Agency: EMA recommends restricting use of Tecovirimat SIGA. 17. March 2026. <https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-restricting-use-tecovirimat-siga#related-medicines> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

European Medicines Agency: Tecovirimat: Summary of Product Characteristics, [https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/tecovirimat-siga-article-20-procedure-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/tecovirimat-siga-article-20-procedure-product-information_en.pdf) (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

FDA: Animal Rule Information. <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/preparedness-research/animal-rule-information> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

FDA: Approval ACAM2000. <https://www.fda.gov/media/181430/download?attachment> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

Imvanex: Product Summary Characteristics. [https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/imvanex-epar-product-information\\_de.pdf](https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/imvanex-epar-product-information_de.pdf) (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

Press release: Large international trial UNITY reports no clinical benefit from tecovirimat for mpox resolution. <https://mpx-response.eu/large-trial-unity-from-the-european-programm-mpx-response-confirms-the-lack-of-efficacy-for-treating-mpox/> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

Rote-Hand-Brief zu Tecovirimat SIGA (Tecovirimat-Monohydrat): Einschränkung der Indikation aufgrund mangelnder Wirksamkeit bei Patienten mit Mpox. 11.05.2026. <https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/DE/RHB/2026/rhb-tecovirimat.html> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

Tembexa: Prescribing Information. [https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda\\_docs/label/2021/214460s000,214461s000lbl.pdf](https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/214460s000,214461s000lbl.pdf) (zuletzt aufgerufen am 25.01.2026)

VIGIV: Prescribing Information. <https://www.fda.gov/media/77004/download?attachment> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

WHO: Clinical management and infection prevention and control for monkeypox: Interim rapid response guidance, 10 June 2022. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-Clinical-and-IPC-2022.1> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

WHO: Disease Outbreak News - Broader transmission of mpox due to clade Ib MPXV – Global situation – 5.12.2025. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON587> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

#### **Hinweise zur Therapie und Prophylaxe von Mpox,**

Stand: Juli 2026; veröffentlicht unter [www.rki.de/stakob.de](http://www.rki.de/stakob.de), DOI 10.25646/10113.15

WHO: Disease Outbreak News. Mpox: recombinant virus with genomic elements of clades Ib and IIb – Global. 14 February 2026  
<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON595> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

WHO: Multi-country external situation report no. 59.  
<https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/multi-country-outbreak-of-mpox--external-situation-report--59.pdf> (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)

WHO: Global mpox trends. [https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx\\_global/](https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/) (zuletzt aufgerufen am 25.06.2026)